St. Joseph's Healthcare Hamilton

Hamilton Health Sciences

Info-médicaments

Antiacides - Hydroxyde d'aluminium et hydroxyde de magnésium

(I-droc-cide d'a-lu-mi-nium et I-droc-cide de ma-gné-zium**)**

Autres noms pour ce médicament

Diovol®
Gelusil®
Maalox™
Mylanta™
Univol®

Il existe beaucoup d'autres noms pour ce médicament.

Utilisation de ce médicament

Ce médicament est un antiacide. Il rend le contenu de l'estomac moins acide. On le prend pour soulager les brûlures d'estomac, l'indigestion acide, le reflux gastrooesophagien et les maux d'estomac. Les antiacides qui contiennent un ingrédient appelé siméthacone aident aussi à réduire les gaz. Recherchez cet ingrédient sur l'étiquette du produit.

Comment prendre ce médicament

Prenez ce médicament exactement comme vous l'a prescrit votre médecin. Si vous achetez ce médicament sans ordonnance, suivez le mode d'emploi sur l'étiquette.

Ce médicament ne devrait être pris qu'à l'occasion, pas tous les jours. Si vous avez toujours mal à l'estomac, consultez votre médecin ou votre fournisseur de soins de santé.

Ce médicament se vend sous forme de comprimés à croquer ou sous forme de liquide.

Comprimé : Il faut bien croquer le comprimé avant de l'avaler. Buvez un grand verre d'eau après.

Liquide : Il faut agiter le liquide avant chaque usage afin de bien mélanger les ingrédients médicamenteux.

Si vous prenez d'autres médicaments par voie orale, parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin. Certains médicaments ne devraient pas se prendre dans l'heure suivant la prise d'un antiacide, car ils se fixent aux antiacides, ce qui peut nuire à l'effet des médicaments en question.

Malaises que vous pourriez ressentir pendant que vous prenez ce médicament

- goût crayeux
- diarrhée ou constipation

Pour prévenir la constipation, consommez des aliments riches en fibres, buvez de six à huit verres de liquide tous les jours et faites de l'exercice régulièrement. Les produits de grains entiers, les légumes et les fruits sont des exemples d'aliments riches en fibres.

Appelez votre médecin dans les situations suivantes :

- diarrhée ou constipation grave
- perte d'appétit
- fatigue inhabituelle
- faiblesse musculaire
- changements d'humeur

© Hamilton Health Sciences and
St. Joseph's Healthcare, Hamilton, 2010
PD 7213 – 06/2010
dpc/pted/cards/DrugCardBooklet/AlumHydroxideMagHydroxideFRENCHPORTRAIT-pe.doc
dt/June 8, 2010